



Buenos Aires 30 de octubre de 2020

Estimado Alumno

Debido al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, el Comité Olímpico de la Olimpiada Matemática Argentina ha decidido que tomará la Olimpiada de Mayo con modalidad virtual, como se explica a continuación.

La prueba tendrá lugar el sábado 7 noviembre de 10 a 13 horas. Consta de 5 problemas que deberán ser resueltos en tres horas.

Hay dos niveles:

- **primer nivel**, para los menores de 13 años, es decir los nacidos a partir del 1º de enero de 2007
- **segundo nivel**, para los chicos entre 13 y 15 años, es decir, los nacidos entre el 1º de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2006

### Instrucciones para rendir la prueba

Los alumnos deberán inscribirse en el siguiente formulario, en el que obligatoriamente deberán consignar una dirección de **Gmail**, para recibir el link de la prueba y el link de Meet.

<https://forms.gle/Gfdv82Hih58PYFk7>

**Cierre de inscripción: jueves 5 de noviembre a las 18 horas.**

Los alumnos deberán resolver la prueba en papel con birome negra y luego escanear sus hojas generando un **único archivo** PDF, que tendrán que enviar por mail a la siguiente dirección [omapuebas@gmail.com](mailto:omapuebas@gmail.com) (exclusivamente para recibir pruebas, no se contestarán consultas de ningún tipo. **Importante:** en el asunto del mail **escribir nombre, DNI y nivel del participante** (ejemplos "Juan Pérez - 45673298 – Primer Nivel" o "María Pérez - 43278130 – Segundo Nivel").

Con la intención de aproximarnos a la modalidad de resolución presencial, intentaremos generar un ambiente lo más parecido posible a lo que fueron los certámenes antes de la pandemia. Es por ello, que la prueba estará organizada en grupos y cada grupo estará conectado a través de Meet con un coordinador de OMA quien supervisará que el certamen se esté llevando a cabo con las características deseadas y que se indican más abajo.

Para ello, estarán recibiendo veinte minutos antes de la prueba, un link de invitación al Meet para conectarse **con cámara activa durante las tres horas que durará el certamen.**

## Escaneo de la prueba

Existen varias aplicaciones que permiten escanear y convertir a PDF usando la cámara del celular, una de ellas es CamScanner. Aquí hay un video que explica cómo descargarla y usarla:

<https://www.youtube.com/watch?v=yDDetBN9nog>

Si nunca hicieron esto antes deben aprender a usarlo antes de la prueba (o sea que hagan el ensayo de escanear al menos dos hojitas armando un PDF) y revisen que el archivo quede legible y no le falten páginas.

El tiempo límite para el escaneo y envío de la prueba será el sábado 7 de noviembre a las 13:30 hs.

## Normas generales

- No se puede consultar libros ni usar calculadora o computadora.
- La interpretación de los enunciados está a cargo de los alumnos participantes. No se responden preguntas.
- Los razonamientos y cálculos que intervienen en la resolución de los problemas deben consignarse en la hoja de la prueba.
- No puede usarse ningún programa de la computadora para resolver los problemas.
- Los problemas deben ser resueltos por los alumnos participantes en forma individual. No pueden consultar con otros alumnos ni recibir ayuda de profesores o padres (excepto en cuestiones informáticas relacionadas con la recepción y el envío de las pruebas).

Las pruebas son difíciles, por eso sólo invitamos a los alumnos que llegaron al certamen nacional. Para que conozcas el grado de dificultad y te prepares para la competencia te enviamos los enunciados de las pruebas que se tomaron en 2018 y 2019, con sus soluciones.

**No olvides inscribirte antes del jueves 5 en el link <https://forms.gle/Gfdlv82Hih58PYFk7>**

Cordialmente.




**Patricia Fauring**  
Comité Olímpico



**Flora Gutierrez**  
Comité Olímpico

**XXIV<sup>a</sup> OLIMPIADA de MAYO**  
**Primer Nivel**  
**Mayo de 2018**



Duración de la prueba: 3 horas.

Cada problema vale 10 puntos.

No puedes usar calculadora; no puedes consultar libros ni apuntes.

Justifica cada una de tus respuestas.

Al participar te comprometes a no divulgar los problemas hasta el 27 de mayo.

**PROBLEMA 1**

Juan hace una lista de 2018 números. El primero es el 1. Luego, cada número se obtiene de sumarle al anterior alguno de los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9.

Sabiendo que ninguno de los números de la lista termina en 0, ¿cuál es el mayor valor que puede tener el último número de la lista?

**PROBLEMA 2**

Se efectúan mil divisiones enteras: se divide 2018 entre cada uno de los números enteros del 1 al 1000. Se obtienen así mil cocientes enteros con sus respectivos restos. ¿Cuál de estos mil restos es el mayor?

**PROBLEMA 3**

Sea  $ABCDEFGHIJ$  un polígono regular de 10 lados que tiene todos sus vértices en una circunferencia de centro  $O$  y radio 5. Las diagonales  $AD$  y  $BE$  se cortan en  $P$  y las diagonales  $AH$  y  $BI$  se cortan en  $Q$ . Calcular la medida del segmento  $PQ$ .

**PROBLEMA 4**

Ana debe escribir 7 enteros positivos, no necesariamente distintos, alrededor de una circunferencia de manera que se cumplan las siguientes condiciones:

- La suma de los siete números es igual a 36.
- Si dos números son vecinos la diferencia entre el mayor y el menor es igual a 2 o 3.

Hallar el máximo valor del mayor de los números que puede escribir Ana.

**PROBLEMA 5**

En cada casilla de un tablero de  $5 \times 5$  se escribe uno de los números 2, 3, 4 o 5 de manera que la suma de todos los números en cada fila, en cada columna y en cada diagonal siempre sea par. ¿De cuántas formas podemos llenar el tablero?

*Aclaración.* Un tablero de  $5 \times 5$  tiene exactamente 18 diagonales de diferentes tamaños. En particular, las esquinas son diagonales de tamaño 1.

**XXIV<sup>a</sup> OLIMPIADA de MAYO**  
**Segundo Nivel**  
**Mayo de 2018**



Duración de la prueba: 3 horas.

Cada problema vale 10 puntos.

No puedes usar calculadora; no puedes consultar libros ni apuntes.

Justifica cada una de tus respuestas.

Al participar te comprometes a no divulgar los problemas hasta el 27 de mayo.

**PROBLEMA 1**

Se tiene un número entero de 4 dígitos que es un cuadrado perfecto. Se construye otro número sumándole 1 al dígito de las unidades, restándole 1 al dígito de las decenas, sumándole 1 al dígito de las centenas y restándole 1 al dígito de las unidades de mil. Si el número que se obtiene es también un cuadrado perfecto, hallar el número original. ¿Es único?

**PROBLEMA 2**

En un tablero de  $4 \times 4$  están escritos los números del 1 al 16, uno en cada casilla. Andrés y Pablo eligen cuatro números cada uno. Andrés elige el mayor de cada fila y Pablo, el mayor de cada columna. Un mismo número puede ser elegido por ambos. Luego, se eliminan del tablero todos los números elegidos. ¿Cuál es el mayor valor que puede tener la suma de los números que quedan en el tablero?

**PROBLEMA 3**

Los 2018 residentes de un pueblo están estrictamente divididos en dos clases: caballeros, que siempre dicen la verdad, y mentirosos, que siempre mienten. Cierta día todos los residentes se acomodaron alrededor de una circunferencia y cada uno de ellos anunció en voz alta “*Mis dos vecinos, el de la izquierda y el de la derecha, son mentirosos*”. A continuación uno de los residentes abandonó el pueblo. Los 2017 que quedaron se acomodaron nuevamente en una circunferencia (no necesariamente en el mismo orden que antes) y cada uno de ellos anunció en voz alta “*Ninguno de mis vecinos, el de la izquierda y el de la derecha, es de mi misma clase*”. Determinar, si es posible, de qué clase es el residente que abandonó el pueblo, caballero o mentiroso.


**PROBLEMA 4**

En un paralelogramo  $ABCD$ , sea  $M$  el punto del lado  $BC$  tal que  $MC = 2BM$  y sea  $N$  el punto del lado  $CD$  tal que  $NC = 2DN$ . Si la distancia del punto  $B$  a la recta  $AM$  es 3, calcular la distancia del punto  $N$  a la recta  $AM$ .

**PROBLEMA 5**

Cada punto de una circunferencia está coloreado con uno de 10 colores. ¿Es cierto que para cualquier coloración hay 4 puntos del mismo color que son vértices de un cuadrilátero con dos lados paralelos (un trapecio isósceles o un rectángulo)?

XXV<sup>a</sup> OLIMPIADA de MAYO  
Primer Nivel  
Mayo de 2019



Duración de la prueba: 3 horas.

Cada problema vale 10 puntos.

No puedes usar calculadora; no puedes consultar libros ni apuntes.

Justifica cada una de tus respuestas.

Al participar te comprometes a no divulgar los problemas hasta el 25 de mayo.

### PROBLEMA 1

Hallar todos los números de dos dígitos  $\overline{ab}$  que elevados al cuadrado dan un resultado donde los dos últimos dígitos son  $\overline{ab}$ .

### PROBLEMA 2

En un torneo de ajedrez participaron más de cinco competidores. Cada competidor jugó exactamente una vez contra cada uno de los otros competidores. Cinco de los competidores perdieron cada uno exactamente dos juegos. Todos los demás competidores ganaron, cada uno, exactamente tres juegos. No hubo empates en el torneo. Determinar cuántos competidores hubo y mostrar un torneo que verifique todas las condiciones.

### PROBLEMA 3

Gus tiene que hacer una lista de 250 números enteros positivos, no necesariamente distintos, tal que cada número sea igual a la cantidad de números de la lista que son distintos de él. Por ejemplo, si 15 es un número de la lista entonces la lista contiene 15 números distintos de 15. Determinar la máxima cantidad de números distintos que puede contener la lista de Gus.

### PROBLEMA 4


Hay que dividir un papel cuadrado en tres partes, mediante dos cortes rectos, de modo que al ubicar estas partes de forma adecuada, sin huecos ni superposiciones, se forme un triángulo obtusángulo. Indicar cómo cortar el cuadrado y cómo armar el triángulo con las tres partes.

**Nota.** Un triángulo es obtusángulo si uno de sus ángulos mide más de  $90^\circ$ .

### PROBLEMA 5

Se tiene un tablero de tres filas y 2019 columnas. En la primera fila están escritos los números enteros de 1 a 2019 inclusive, ordenados de menor a mayor. En la segunda fila, Ana escribe esos mismos números pero ordenados a su elección. En cada casilla de la tercera fila se escribe la diferencia entre los dos números ya escritos en su misma columna (el mayor menos el menor). Beto tiene que pintar algunos números de la tercera fila de manera que la suma de los números pintados sea igual a la suma de los números de esa fila que quedaron sin pintar. ¿Puede Ana completar la segunda fila de manera que Beto no logre su objetivo?

XXV<sup>a</sup> OLIMPIADA de MAYO  
Segundo Nivel  
Mayo de 2019



Duración de la prueba: 3 horas.

Cada problema vale 10 puntos.

No puedes usar calculadora; no puedes consultar libros ni apuntes.

Justifica cada una de tus respuestas.

Al participar te comprometes a no divulgar los problemas hasta el 25 de mayo.

### PROBLEMA 1

Un entero positivo es *piola* si los 9 restos que se obtienen al dividirlo entre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 son todos diferentes y distintos de cero. ¿Cuántos enteros piolas hay entre 1 y 100000?

### PROBLEMA 2

Se tiene un tablero con 2020 casillas en la fila inferior y 2019 en la superior, ubicadas como se muestra en la figura.



En la fila inferior se colocan los números enteros del 1 al 2020 en algún orden. Luego en cada casilla de la fila superior se anota la multiplicación de los dos números que tiene debajo. ¿Cómo se pueden colocar los números en la fila inferior para que la suma de los números de la fila superior sea la menor posible?

### PROBLEMA 3

En los lados  $AB$ ,  $BC$  y  $CA$  de un triángulo  $ABC$  se ubican los puntos  $P$ ,  $Q$  y  $R$  respectivamente, tales que  $BQ = 2QC$ ,  $CR = 2RA$  y  $PRQ = 90^\circ$ . Demostrar que  $APR = RPQ$ .

### PROBLEMA 4

Encontrar el menor número entero positivo  $N$  de dos o más dígitos que tiene la siguiente propiedad: Si insertamos cualquier dígito no nulo  $d$  entre cualesquiera dos dígitos adyacentes de  $N$  obtenemos un número que es múltiplo de  $d$ .

### PROBLEMA 5

Consideramos los  $n$  vértices de un polígono regular de  $n$  lados. Se tiene un conjunto de triángulos con vértices en estos  $n$  puntos con la propiedad que para cada triángulo del conjunto, al menos uno de sus lados no es lado de ningún otro triángulo del conjunto. ¿Cuál es la mayor cantidad de triángulos que puede tener el conjunto?

## Soluciones Olimpiada de Mayo. 2018

### Primer Nivel

#### Problema 1

**Solución.** Llamamos *movida* a la operación de sumar un dígito al último número de la lista. Debemos aplicarle a 1 una sucesión de 2017 movidas. Sea  $N$  un número natural que no termina en 0. Observamos que al sumar 9 al número  $N$  su último dígito disminuye en 1. Sigue que no podemos aplicar 9 veces la movida de sumar 9 comenzando con  $N$  (o en otro caso una de las movidas nos lleva a 0 como último dígito). Entonces si se aplican 9 movidas consecutivas a  $N$ , al menos una de ellas debe sumar un número menor que 9, lo que significa que el incremento debido a esas 9 movidas es a lo sumo  $8 \cdot 9 + 8 = 80$ . Consideramos las  $2016 = 224 \cdot 9$  movidas luego de la primera. Se pueden dividir en 224 grupos, que son cada uno de 9 movidas consecutivas, entonces el incremento total que producen es menor o igual que  $224 \cdot 80 = 17920$ . La primera movida transforma al número inicial 1 en a lo sumo 9 (sumando 8) pues si sumáramos 9 obtendríamos 10, lo que está prohibido. Luego el resultado al cabo de 2017 movidas es a lo sumo 17929. Recíprocamente, se puede obtener 17929 con 2017 movidas. La construcción está sugerida por el razonamiento anterior. La primera movida es 8, que coloca a 9 como último dígito. Las siguientes 8 movidas son 9, hasta que el último dígito sea 1, seguido de una movida 8 que, de nuevo, coloca el último dígito en 9. Las 9 movidas descriptas dan un incremento de 80, de modo que el número resultante es  $9 + 80$ . Aplicamos la misma tira de 9 movidas consecutivas 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8 otras 223 veces. Todas las movidas son legítimas y el resultado final es  $9 + 224 \cdot 80 = 17929$ .

#### Problema 2

**Solución.** Si se divide 2018 entre 673 se obtiene como resto 672 ( $2018 = 673 \cdot 2 + 672$ ). Afirmamos que 672 es el mayor de los restos. En efecto, si se divide 2018 entre un entero  $d$  con  $1 \leq d \leq 672$  entonces el resto será a lo sumo  $d - 1 \leq 671$ . Y si se divide 2018 entre un entero  $d$  con  $674 \leq d \leq 1000$  entonces el cociente será 2 (pues  $2 < \frac{2018}{1000} < \frac{2018}{674} < 3$ ) y el resto será  $2018 - 2d \leq 2018 - 2 \cdot 674 = 670 < 672$ ).

#### Problema 3

**Solución.** Sabemos que los ángulos interiores del decágono miden  $144^\circ$  y los ángulos centrales  $36^\circ$ , luego  $\angle AOB = 36^\circ$ . El triángulo  $AOB$  es isósceles de base  $AB$ . Sus ángulos iguales miden

$$\angle OAB = \angle OBA = \frac{180^\circ - 36^\circ}{2} = 72^\circ.$$

Los trapecios  $ABCD$ ,  $BCDE$ ,  $IJAB$ ,  $HIIA$  son congruentes pues todos se forman con tres lados consecutivos del decágono y una diagonal que los abarca. Calculemos los ángulos de estos trapecios. Como  $\angle ABC = \angle BCD = 144^\circ$

$$\text{tenemos } \angle BAD = \angle CDA = \frac{360^\circ - 2 \cdot 144^\circ}{2} = 36^\circ. \text{ Es claro que}$$

lo mismo ocurre en los otros tres trapecios, tienen dos ángulos de  $36^\circ$  y dos ángulos de  $144^\circ$ .

En el triángulo  $ABP$ ,  $\angle BAP = 36^\circ$  y


$$\angle ABP = 144^\circ - 36^\circ = 108^\circ, \text{ luego}$$

$\angle BPA = 180^\circ - 36^\circ - 108^\circ = 36^\circ$ . Entonces el triángulo  $ABP$  es isósceles con  $BP = AB$ . Del mismo modo se prueba que el triángulo  $QAB$  es isósceles.

Ahora, el cuadrilátero  $PBAQ$  es un trapecio isósceles, de modo que  $AB \parallel PQ$ .

$$\text{En el triángulo } BQP, \angle BQP = \angle AQP - \angle AQB = \frac{360^\circ - 2 \cdot 108^\circ}{2} - 36^\circ = 36^\circ, \angle QBP = 108^\circ - 36^\circ = 72^\circ \text{ y}$$

$\angle BPQ = 180^\circ - 36^\circ - 72^\circ = 72^\circ$ . Luego este triángulo es isósceles de base  $BP$ , así que tiene sus



ángulos y su base iguales a los del triángulo  $AOB$ . Entonces  $BQP$  es congruente a  $AOB$  y  $PQ = AO = 5$ .

#### Problema 4

**Solución.** El máximo es 9. Denotamos a los números  $c, b, a, M, x, y, z$  recorridos en el sentido de las agujas del reloj, con  $M$  el mayor de los siete. En busca de una contradicción, supongamos que  $M \geq 10$ . Como la diferencia entre números adyacentes es 2 o 3 tenemos  $a \geq 7, b \geq 4, c \geq 1$  y por ende  $a+b+c \geq 7+4+1=12$ . Luego  $x+y+z \leq 36-M-12 \leq 14$ . Por simetría también valen las desigualdades  $x+y+z \geq 12$  y  $a+b+c \leq 14$ .

Si  $a \geq 8$  entonces  $b \geq 5, c \geq 2$  y  $a+b+c > 14$ . Luego  $a \leq 7$  y  $M \geq 10$  implica  $a=7$ . De modo análogo  $x=7$  y las desigualdades de arriba nos dan  $5 \leq b+c \leq 7, 5 \leq y+z \leq 7$ .

Consideramos  $5 \leq b+c \leq 7$ . Tenemos que  $b < 7, c < 7$ , luego  $b = a-3 = 4$  o  $b = a-2 = 5$ . Si  $b=4$  entonces  $1 \leq c \leq 3$ . Como  $b$  y  $c$  difieren en 2 o 3 sigue que  $c \in \{1, 2\}$ . Y si  $b=5$  entonces  $c \in \{1, 2\}$  (de hecho  $c=2$  es la única opción). En los dos casos posibles hemos obtenido  $c \in \{1, 2\}$ .

Un argumento simétrico basado en  $5 \leq y+z \leq 7$  conduce a  $z \in \{1, 2\}$ . Sin embargo entonces los números adyacentes  $c$  y  $z$  difieren en 0 o 1, lo que es imposible. Un ejemplo con  $M=9$ : 1, 4, 7, 9, 7, 5, 3.

#### Problema 5

**Solución.** Primero vamos a considerar la paridad de los números que irán en las 25 casillas, para esto, colocamos en cada casilla del tablero un 0 o un 1, donde el 0 indicará que en esa casilla hay un número par y el 1 indicará que en esa casilla hay un número impar. Ahora, vamos a determinar el número de formas de colocar un 0 o un 1 en cada casilla de tal manera que la suma de todos los números en cada fila, en cada columna y en cada una de las diagonales de cualquier tamaño siempre sea par. Es claro que en las cuatro esquinas debe ir un 0, pues según el problema, la suma de todos los números en cada diagonal de cualquier tamaño es par, y las esquinas son diagonales de tamaño 1. Notemos que si colocamos números cualesquiera (0 o 1) en las casillas  $x, y, z, w$  de la Figura 1, el resto del tablero se puede llenar de manera única (ver Figura 2), donde las operaciones están definidas en módulo 2.

0			$y$	0
$x$				
				$z$
0	$w$			0

Figura 1

$\Rightarrow$

0	$x$	$x+y$	$y$	0
$x$	$y+w$	$z+w$	$x+z$	$y$
$w+x$	$y+z$	0	$x+w$	$y+z$
$w$	$x+z$	$x+y$	$y+w$	$z$
0	$w$	$z+w$	$z$	0

Figura 2

Además, para cualesquiera  $x, y, z, w$  la distribución de números de la figura 2 cumple las condiciones del problema.

Como hay  $2^4 = 16$  ternas  $(x, y, z, w)$  concluimos que el tablero de  $5 \times 5$  se puede llenar de 16 formas con ceros y unos. Ahora, para llenar las casillas con los números 2, 3, 4, 5 cumpliendo lo pedido haremos lo siguiente: en cada casilla que tiene escrito un 0, borramos el 0 y escribimos 2 o 4; y en cada casilla que tiene escrito un 1, borramos el 1 y escribimos 3 o 5. En síntesis, cada una de las 25 casilla se puede llenar de dos formas. Por lo tanto, el tablero de  $5 \times 5$  se puede llenar con los números 2, 3, 4, 5 de  $16 \times 2^{25} = 2^{29}$  formas.

## Segundo Nivel

### Problema 1

**Solución.** Sean  $m^2$  y  $n^2$  los dos números, entonces

$$m^2 - n^2 = (a10^3 + b10^2 + c10 + d) - ((a-1)10^3 + (b+1)10^2 + (c-1)10 + (d+1)) = \\ = 10^3 - 10^2 + 10 - 1 = 909 = 3^2 \cdot 101.$$

Luego  $m^2 - n^2 = (m-n)(m+n) = 3^2 \cdot 101$ .

Hay 3 casos

$$\begin{cases} m-n=1 \\ m+n=909 \end{cases}; \begin{cases} m-n=3 \\ m+n=303 \end{cases}; \begin{cases} m-n=9 \\ m+n=101 \end{cases}$$

pero en los dos primeros  $m^2$  y  $n^2$  tienen más de 4 dígitos (en el primero,  $m = 455$  y en el segundo,  $m = 153$ ). En el tercer caso tenemos que

$$2m = 110 \Rightarrow m = 55 \text{ y } n = 46.$$

Así  $m^2 = 3025$  y  $n^2 = 2116$ .

Son los únicos que satisfacen las condiciones.

### Problema 2

**Solución.** Sean  $a > b > c > d$  los cuatro mayores números elegidos. Claramente  $a = 16$ . Además, existe una fila o columna que contiene al 15 y no contiene al 16, entonces  $b = 15$ .

Hay a lo más 4 números que cumplen lo siguiente: La fila que lo contiene tiene un elemento del conjunto  $\{15, 16\}$  y la columna que lo contiene también.

16	×	
×	15	

Luego,  $c$  es el mayor de los al menos 12 números restantes, entonces  $c \geq 12$ .

Hay a lo más 9 números que cumplen lo siguiente: La fila que lo contiene tiene un elemento del conjunto  $\{c, 15, 16\}$  y la columna que lo contiene también.

16	×	×	
×	15	×	
×	×	$c$	

Luego,  $d$  es el mayor de los al menos 7 números restantes, entonces  $d \geq 7$ .

Sabemos que al menos cuatro números van a ser eliminados, entonces la suma de los números borrados es al menos  $a + b + c + d \geq 16 + 15 + 12 + 7 = 50$ , por lo cual, la suma de los números restantes es a lo más  $\frac{16 \cdot 17}{2} - 50 = 86$ . Un ejemplo con 86 es el siguiente:

16	13	8	1
14	15	9	2
10	11	12	3
4	5	6	7

 $\longrightarrow$ 

	13	8	1
14		9	2
10	11		3
4	5	6	

Por lo tanto, el mayor valor es 86.

### Problema 3

**Solución.** Notemos que cada caballero ha hecho las dos veces la misma afirmación: *Mis dos vecinos son mentirosos*, y estas afirmaciones son verdaderas. Luego los caballeros están aislados en ambos arreglos circulares y no hay dos caballeros adyacentes. En otras palabras, los arreglos

consisten de caballeros aislados, separados por bloques de mentirosos consecutivos (la cantidad de bloques es igual a la cantidad de caballeros).

En el primer arreglo cada mentiroso afirmó *Mis dos vecinos son mentirosos*, y esto es falso.

Entonces cada mentiroso tiene al menos un vecino caballero. Se sigue que todo bloque de mentirosos consecutivos tiene longitud a lo sumo 2. Sea  $k$  el número de caballeros entre los 2018 residentes. Tomando en cuenta los  $k$  caballeros y los  $k$  grupos de a lo sumo 2 mentirosos

obtenemos  $2018 \leq k + 2k = 3k$ . Luego  $k \geq \frac{2018}{3}$ .

En el segundo arreglo cada mentiroso afirmó *Ninguno de mis vecinos, el de la izquierda y el de la derecha, es de mi misma clase* y esto es falso. De modo que cada mentiroso tiene por lo menos un vecino mentiroso. lo que implica que todo bloque de mentirosos consecutivos tiene longitud mayor o igual que 2. Sea  $\ell$  el número de caballeros en el arreglo de 2017 residentes; es claro que  $\ell = k$  o  $\ell = k - 1$  según el residente que abandonó el pueblo sea un mentiroso o un caballero.

Tomando en cuenta los  $\ell$  caballeros y los  $\ell$  bloques de longitud mayor o igual que 2 obtenemos  $2017 \geq \ell + 2\ell = 3\ell$ . De modo que  $\ell \leq \frac{2017}{3}$ .

En síntesis,  $\ell \leq \frac{2017}{3} < \frac{2018}{3} \leq k$  de modo que  $\ell < k$ . Por lo tanto,  $\ell = k - 1$  lo que significa que el residente que se fue es un caballero.

#### Problema 4

**Solución.** Sean  $E, F, G$  y  $H$  puntos en la recta  $AM$  tales que  $DE, BF, CG$  y  $NH$  son perpendiculares a la recta  $AM$ . Los triángulos rectángulos  $BFM$  y  $DEA$  tienen los mismos ángulos, pues sus lados son respectivamente paralelos. Por

lo tanto, son semejantes, y como  $\frac{AD}{BM} = 3$ , la razón de semejanza es 3. De esto

deducimos que  $DE = 3BF = 9$ .


Análogamente los triángulos  $CGM$  y  $BFM$  son semejantes de razón 2. Por lo tanto,  $CG = 2BF = 6$ .

Sea  $P$  el punto medio de  $NC$  y  $Q$  el pie de la perpendicular a  $AM$  trazada por  $P$ . Esto se puede ver en la figura

Sea  $HN = x$  la distancia requerida. Notamos que  $PQ$  es base media del trapecio  $GCMH$ , luego

$$PQ = \frac{x+6}{2}, \text{ además, } HN \text{ es base media del trapecio } PQED, \text{ luego } HN = x = \frac{PQ+9}{2} = \frac{\frac{x+6}{2}+9}{2},$$

de donde  $x = 8$ , que es la distancia que nos piden.



#### Problema 5

**Solución.** Tales 4 puntos existen para cualquier coloración de la circunferencia con 10 colores. Es suficiente demostrar que hay 4 puntos distintos  $A, B, C, D$  del mismo color tales que  $AB = CD$ ; entonces  $AC \parallel BD$  o  $AD \parallel BC$ .

Sea  $P$  un polígono regular de  $2n+1$  lados inscrito en la circunferencia donde  $n$  se especificará

más tarde. Al menos  $\frac{1}{10}(2n+1)$  vértices de  $P$  son del mismo color. Consideramos  $k \geq \frac{1}{10}(2n+1)$

de tales vértices y las  $\frac{1}{2}k(k-1)$  distancias entre ellos. Llamamos a estas distancias admisibles y

notamos que ellas toman a lo sumo  $n$  valores diferentes pues nuestros puntos son vértices de  $P$ .

Luego alguna distancia admisible ocurre por lo menos

$$\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{2}k(k-1) \geq \frac{1}{2n} \cdot \frac{2n+1}{10} \cdot \frac{2n-9}{10} = \frac{(2n+1)(2n-9)}{200n} \text{ veces. Se puede elegir } n \text{ suficientemente}$$

grande de modo que  $\frac{(2n+1)(2n-9)}{200n} > 3$  (basta tomar  $n \geq 155$ ). Esto asegura al menos 4

segmentos con extremos del mismo color y longitudes iguales. Observemos que cada vértice de  $P$  puede ser extremo común de a lo sumo dos de tales segmentos iguales. Se sigue que entre los ya mencionados 4 segmentos hay dos que no tienen ningún extremo común, lo que completa el argumento.

Primer Nivel

### Problema 1

**Solución.** Acotamos los valores posibles del último dígito de los números cuyos cuadrados tienen igual cifra de las unidades que el número. La lista es:

$$0, 1, 5, 6,$$

pero el número no puede terminar en 0, porque en ese caso el cuadrado termina en 00 y  $\overline{00}$  no es un número de dos cifras.

Analizamos qué pasa si el número de dos dígitos es de la forma  $\overline{a1}$ ,  $a \neq 0$ :

$$(10a + 1)^2 = 100a^2 + 20a + 1.$$

Vemos que no hay valores de  $a$  que cumplan:

$$(\overline{a1})^2 = \dots a1.$$

Efectivamente,  $(10a+1)^2 = 100a^2 + 20a + 1$  que tiene la cifra de las decenas igual a la de  $2a$  y por lo tanto, distinta de  $a$ .

Para la forma  $\overline{a5}$ :

$$(10a + 5)^2 = 100a^2 + 100a + 25.$$

Como  $100a^2 + 100a$  es múltiplo de 100, la única posibilidad es  $a = 2$ .

Tenemos entonces un número que cumple las condiciones del problema: 25.

Para la forma  $\overline{a6}$ , haremos los cálculos:

$$(10a + 6)^2 = 100a^2 + 120a + 36$$

que termina en  $a6$  solo si  $2a+3$  termina en  $a$ , o sea si  $2a+3 = 10+a$ , o sea,  $a = 7$ . Obtenemos así la segunda solución:

$$76.$$

Hay dos números que cumplen la condición del problema: 25 y 76

### Problema 2

**Solución.** Sea  $n$  el número de competidores. Cada uno de los 5 competidores mencionados jugó  $n-1$  juegos. Como perdió 2, cada uno ganó  $n-1-2 = n-3$  juegos.

Cada uno de los otros  $n-5$  competidores también jugó  $n-1$  juegos, ganando 3 y perdiendo  $n-1-3 = n-4$  juegos cada uno.

Así, en total el número de juegos perdidos es  $5 \cdot 2 + (n-5)(n-4)$  y el de juegos ganados es  $(n-5)3 + 5(n-3)$ .

Como el número de ganados es igual al número de perdidos se tiene

$$5 \cdot 2 + (n-5)(n-4) = 3(n-5) + 5(n-3),$$

$$n^2 - 17n + 60 = 0,$$

$$(n-5)(n-12) = 0,$$

$$n = 5 \text{ o } n = 12.$$

Como el torneo contiene más de 5 jugadores, debe ser  $n = 12$ .

Si  $n = 12$  hay torneos que cumplen lo pedido, por ejemplo:

Sean  $a_1, \dots, a_5$  los jugadores con dos partidos perdidos y  $b_1, \dots, b_7$  los que tienen tres partidos ganados. Consideramos los subíndices de  $a_i$  en módulo 5 y los de  $b_i$  en módulo 7. Cada  $a_i$  le ganó a  $a_{i+1}$  y  $a_{i+2}$ , y perdió con  $a_{i-1}$  y  $a_{i-2}$ . Cada  $b_i$  le ganó a  $b_{i+1}, b_{i+2}, b_{i+3}$  y perdió con  $b_{i-1}, b_{i-2}, b_{i-3}$ . Además, cada  $a_i$  le ganó a cada  $b_j$ .

### Problema 3

**Solución.** La respuesta es 21. Dividimos la lista en grupos de números iguales. Entonces el número de grupos es igual a la cantidad  $N$  de números distintos que contiene la lista. Sea un grupo  $G$  que consiste de todas las  $x_a$  copias de un número dado  $a$ . Por hipótesis  $a$  es igual al tamaño total de todos los grupos distintos de  $G$ , que es  $250 - x_a$ . En particular  $a \neq b$  implica  $x_a \neq x_b$ .


Entonces los  $N$  grupos tienen distinto tamaño y su tamaño total es a lo sumo  $1 + 2 + \dots + N$ . Sigue

que  $N \leq 21$  pues  $1+2+\dots+22 = 253 > 250$ . Un ejemplo para  $N = 21$ : Para cada  $k = 1, 2, \dots, 20$  tomamos  $k$  copias de  $250 - k$ , en total 210 números, y 40 copias de 210. Esta colección de 250 números satisface las hipótesis.

#### Problema 4

**Solución.** Supongamos sin pérdida de generalidad que  $ABCD$  es un cuadrado de lado 2. Sea  $M$  el punto medio de  $BC$ , trazamos los segmentos  $BD$  y  $DM$  para obtener así las tres partes. En la prolongación de  $CB$  ubicamos un punto  $R$  tal que  $RB=BM=MC=1$  ( $B$  está entre  $R$  y  $C$ ). En la prolongación de  $DB$  ubicamos un punto  $T$  tal que  $DB=BT$ . Notamos que los triángulos  $RBA$  y  $MCD$  son congruentes, entonces  $BRA = CMD$ . Por otro lado, los triángulos  $RBT$  y  $MBD$  son congruentes, entonces  $BRT = BMD$ . Sumando las dos últimas igualdades obtenemos

$BRA + BRT = CMD + BMD = 180^\circ$ , entonces  $A, R$  y  $T$  son colineales. Notamos que con las tres partes en que se dividió el cuadrado se puede formar el triángulo obtusángulo  $ADT$ .



#### Problema 5

**Solución.** La respuesta es no. Vamos a demostrar que para toda permutación  $a_1, a_2, \dots, a_n$  de  $1, 2, \dots, n$  los valores absolutos  $|a_1 - 1|, |a_2 - 2|, \dots, |a_n - n|$  se pueden dividir en dos grupos con sumas iguales. Notemos que  $(a_1 - 1) + (a_2 - 2) + \dots + (a_n - n) = 0$  pues  $a_1, a_2, \dots, a_n$  es una permutación de  $1, 2, \dots, n$ . Cada sumando  $a_k - k$  es igual a  $|a_k - k|$  o  $-|a_k - k|$ , según sea  $a_k \geq k$  o  $a_k < k$ . Luego la igualdad anterior se puede escribir como  $\sum_{k=1}^n \varepsilon_k |a_k - k| = 0$ , donde  $\varepsilon_k = 1$  o  $\varepsilon_k = -1$ . Pasamos los sumandos  $\varepsilon_k |a_k - k|$  con  $\varepsilon_k = -1$  al miembro de la derecha. Esto nos da la división que deseábamos.

Cabe destacar que se pueden ignorar los sumandos con  $|a_k - k|$  igual a cero, porque estos pueden agregarse a cualquier grupo una vez hecha la separación que se explicó.

Todo esto nos indica una manera de pintar: Beto marca las columnas en las que los números de la primera fila que son más grandes que los de la segunda fila y pinta los números en la tercera fila de las columnas marcadas.


Segundo Nivel

#### Problema 1

**Solución.** Supongamos que  $n$  es piola. Como  $n$  dividido entre 2 puede dejar solo restos 0 o 1, y el enunciado establece que no puede dejar resto 0, debe dejar resto 1. Ahora  $n$  entre 3 no puede dejar resto 0 ni 1, luego la única posibilidad que le queda es dejar resto 2. Continuando del mismo modo resulta que  $n$  entre  $k$  deja resto  $k - 1$  para  $k = 2, \dots, 10$ . Entonces  $n + 1$  es múltiplo de  $2, \dots, 10$ , y por lo tanto es múltiplo del mínimo común múltiplo de esos números que es  $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 = 2520$ . Es decir que los números piolas son los de la forma  $2520t - 1$  para  $t$  entero positivo. La condición  $1 \leq 2520t - 1 \leq 100000$  equivale a  $1 \leq t \leq \frac{100001}{2520}$  o  $1 \leq t \leq 39$ , es decir que hay 39 enteros piolas entre 1 y 100000.

#### Problema 2


**Solución.** Veamos cómo se deben ordenar los números para minimizar la suma. En primer lugar, el 2020 debe estar en un extremo, pues si no es así vamos a tener




Si en la fila de abajo damos vuelta todos los números del intervalo marcado con una llave, es decir cambiamos  $2020 \ a \ b \ \dots \ c \ d \ y$  por  $y \ d \ c \ \dots \ b \ a \ 2020$ , en la fila de arriba tenemos los mismos productos en otro orden, excepto  $2020 \cdot x$  que se cambió por  $x \cdot y$ . Como  $y < 2020$ , tenemos un número menor. En una configuración en la que la suma es mínima, 2020 debe estar en un borde. Con un razonamiento análogo vemos que si 2020 está en un borde, 2019 debe estar en el otro borde.

Ahora hacemos la siguiente observación. Dados cuatro números positivos distintos, si los separamos en dos parejas y calculamos la suma de sus productos, el menor resultado se obtiene cuando en una de las parejas está el número más grande con el más chico. Es decir, dados  $0 < a < b < c < d$ , tenemos  $ad + bc < ab + cd$  y  $ad + bc < ac + bd$ . Esto es cierto porque  $ad + bc < ab + cd$  es equivalente a  $(c - a)(d - b) > 0$  y  $ad + bc < ac + bd$  es equivalente a  $(b - a)(d - c) > 0$ .

Con esta observación en mente vemos que 1 debe estar al lado de 2020. Supongamos que no, entonces



Si damos vuelta el intervalo marcado, la suma de los productos pierde  $x \cdot 1$  e  $y \cdot 2020$ , y gana  $x \cdot y$  y  $1 \cdot 2020$ . Como  $1 < x, y < 2020$ , tenemos que  $x \cdot y + 1 \cdot 2020 < x \cdot 1 + y \cdot 2020$ , por lo que 1 debe estar al lado de 2020. De igual manera, 2 debe estar al lado de 2019, pues si damos vuelta el intervalo la suma disminuye ya que tenemos  $x \cdot y + 2 \cdot 2019 < 2019 \cdot y + x \cdot 2$  pues  $2 < x, y < 2019$ .



Repitiendo este razonamiento obtenemos que los números deben estar ubicados de la siguiente manera


2019 2 2017 4 ... 1013 1010 1011 1012 1009 1014 ... 3 2018 1 2020.

Si al comenzar resulta que 2020 está en la otra punta obtenemos el orden inverso. Estas son las únicas dos posibilidades que realizan el mínimo.

### Problema 3

**Solución.** Sea  $M$  el punto medio de  $RC$  entonces

$AR = RM = MC$  con lo cual  $AM = 2MC$  y  $MQ \parallel AB$ . Sea  $N$  el punto medio de  $PQ$ , entonces  $RN$  es la base media del trapecio  $APQM$ . En el triángulo rectángulo  $PRQ$ ,  $N$  es el punto medio de la hipotenusa  $PQ$ , entonces  $NPR = NRP$  y como  $AP \parallel RN$ , obtenemos que  $APR = NRP$ , entonces  $APR = NPR = RPQ$ .



#### Problema 4

**Solución.** Sea  $\overline{a_1 a_2 \dots a_k}$  un número que cumple las condiciones del enunciado. Al insertar el dígito 2 entre los dos últimos dígitos, obtenemos que  $a_k$  es múltiplo de 2. Análogamente, al insertar el dígito 5, obtenemos que  $a_k$  es múltiplo de 5. Por lo tanto,  $a_k = 0$ .

Sea  $i$  cualquier índice entre 2 y  $k-1$ , inclusive, entonces los números  $\overline{a_1 \dots 7 a_i \dots a_k}$  y  $\overline{a_1 \dots a_i 7 \dots a_k}$  son ambos múltiplos de 7. Al restar obtenemos que  $7 - a_i$  es múltiplo de 7, con lo cual concluimos que  $a_i$  es 0 o 7. Sabemos ahora que cualquier dígito a partir del segundo es 0 o 7, luego, si insertamos un dígito 7 entre los primeros dos dígitos, el resultado debe ser múltiplo de 7, por lo tanto, el primer dígito es 7. Es decir,  $a_1 = 7$ .

Insertando el dígito 8 entre los últimos dos dígitos obtenemos que  $\overline{a_{k-1} 8 0}$  es múltiplo de 8 y como  $a_{k-1}$  es 0 o 7, es claro que la única posibilidad es  $a_{k-1} = 0$ . El número 700 no cumple la condición del problema, entonces si  $a_{k-2} = 7$  debería haber al menos un dígito antes y si insertamos el dígito 8 antes del 7 obtenemos un múltiplo de 8 que termina en 700, lo cual es una contradicción. Por lo tanto,  $a_{k-2} = 0$ .

Tenemos que el número es de la forma  $\overline{7 \dots 000}$  donde cada uno de los otros dígitos es 0 o 7. Si insertamos un dígito 9 después del primer dígito 7, concluimos que la cantidad total de 7 es múltiplo de 9 y, en consecuencia, la cantidad de dígitos 7 es al menos 9. De esta forma el número que buscamos es como mínimo  $777777777000$  y no es difícil comprobar que ese número cumple la condición del enunciado (por ejemplo, si insertamos un dígito 6 en cualquier posición, obtenemos un número que termina en 0 y que tiene suma de dígitos 69, es por eso que obtenemos un múltiplo de 6). Por lo tanto, ese número es el mínimo.

#### Problema 5

**Solución.** La respuesta es  $\binom{n-1}{2} = \frac{(n-1)(n-2)}{2}$ . Tomamos un conjunto de  $k$  de estos triángulos y

hacemos la lista de sus  $3k$  lados. Cada triángulo tiene un lado que es exclusivamente suyo, de modo que la lista contiene  $l \geq k$  que aparecen exactamente una vez. También hay a lo sumo

$\binom{n}{2} - l$  segmentos distintos que aparecen más de una vez (pues  $\binom{n}{2}$  es la cantidad total de

segmentos que unen dos de los  $n$  puntos). Observamos que cada uno de estos segmentos no únicos aparece a lo sumo  $n-2$  veces, pues es lado de a lo sumo  $n-2$  triángulos. Todo lo anterior

implica que  $3k \leq l + (n-2)\left(\binom{n}{2} - l\right)$ . Reescribimos esta desigualdad como

$3k + (n-3)l \leq (n-2)\binom{n}{2} = \frac{1}{2}n(n-1)(n-2)$ . Usamos ahora que  $l \geq k$  para obtener

$nk \leq \frac{1}{2}n(n-1)(n-2)$ . Luego  $k \leq \frac{1}{2}(n-1)(n-2) = \binom{n-1}{2}$ .

Damos a continuación un ejemplo para  $k = \binom{n-1}{2}$ . Tomamos uno de los  $n$  puntos,  $A$ , y

consideramos todos los triángulos con un vértice en  $A$ . Hay  $\binom{n-1}{2}$  de estos triángulos, pues el

lado opuesto a  $A$  puede elegirse de  $\binom{n-1}{2}$  maneras. Además este lado solo le corresponde a uno de los triángulos. Así, este conjunto tiene la propiedad buscada.



NIVEL N° \_\_\_\_\_



# OLIMPIADA MATEMÁTICA ARGENTINA

## AUTORIZACIÓN DE \_\_\_\_\_

Apellidos y Nombres del alumno

Alumno del ..... Nivel .....  
Año que cursa nivel en la Olimpiada

\_\_\_\_\_ Por la  
presente.....

Nombres y apellidos del padre, tutor o encargado

D.N.I., L.C., L.E., C.I. N° ..... domiciliado  
en.....

Calle

N° ..... Piso ..... Dto ..... localidad ..... C.P.  
N° .....

provincia ..... Tel. N° (.....) ..... Cel. N°  
(.....).....

autorizo a mi hijo .....  
D.N.I.....  
Nombres y apellidos del alumno

Fec. Nac..... e-mail  
alumno.....  
alumno de

Nombre del establecimiento

localidad ..... provincia  
.....

a participar en las actividades correspondientes a 26ª Olimpiada de Mayo que se llevará a cabo  
el día 9 de mayo de 2020 en

.....  
.....  
.....  
..... Me hago responsable de todos los traslados de mi hijo desde el domicilio hasta los  
puntos de concentración para las pruebas de la Olimpiada Matemática Argentina; asimismo de  
las consecuencias, de cualquier naturaleza, provenientes de la participación del menor para  
dicha competencia. Por ello, deslindo toda responsabilidad que pudiera atribuirse a la Olimpiada  
Matemática Argentina, a la Olimpiada Matemática Ñandú, al Centro Latinoamericano de  
Matemática e Informática, a la Unión Matemática Argentina y la Fundación Olimpiada  
Matemática Argentina. \_\_\_\_\_

..... Asimismo declaro conocer y aceptar el Reglamento Vigente de la OLIMPIADA  
MATEMÁTICA ARGENTINA y las disposiciones para su organización y  
funcionamiento. \_\_\_\_\_

..... de  
2020.

Lugar y fecha

.....  
Aclaración de firma

.....  
Firma padre, tutor o encargado

Certifico que la firma es la que corresponde

.....de 2020.  
Lugar y fecha

.....  
Firma y sello con aclaración de firma y cargo de la autoridad del establecimiento

.....  
Sello del establecimiento